

名称	コイレット(粒剤)	ミリペーダ(液剤)
用途	ヤンバルトサカヤスデの家屋内への侵入を防止	
配布する薬剤	一世帯あたりひと月に2袋(3kg/袋)	一世帯あたりひと月に1本(500ml/本)
	※一世帯あたり、ひと月にコイレットは2袋、ミリペーダは1本までとします。 以降も受領を希望される場合は、受領日よりひと月以降に申請ください。	
配布方法・ 配布場所	肝付町役場住民課年金環境衛生係の窓口にて、配布申請書(窓口またはホームページから取得ください)を提出ください。 ※配布申請書と同時に、ヤスデの写真も一緒に提出してください。 ※薬剤受領の際は、受領書を記載いただきますので印鑑を持参ください。	
薬剤のつくり方	粒剤をそのまま使用ください。	原液を100倍に希釈して使用ください。 原液のボトルキャップの容量は8ミリリットルです。 (例)約4リットルの薬剤をつくる場合 キャップ5杯(40ミリリットル)分の原液を 4リットルの水で薄めて使用ください。
使用方法	粒剤を、市販の散布器等で建物の外周に広く薄く散布してください。	市販の除草剤用噴霧器、じょうろ等で建物の外周(特に基礎や基礎の垂直部分や通気口)に散布ください。
	※コイレットとミリペーダを併用することが効果的です。	
使用中または 使用後の注意	1. 使用の際は、マスクや手袋などの保護具を着用し、体の露出部を少なくして薬剤を浴びないようにするとともに、できるだけ吸い込まないようにしてください。	
	2. 薬剤の散布中は、喫煙、飲食はしないようにしてください。	
	3. 使用後は手や指などを石鹸でよく洗い、うがいをしてください。	
	4. 薬剤は小児の手に届かないよう厳重に保管し、使用済みの空容器についても、小児が手に触れないようにするとともに、他に転用しないでください。	
散布量の目安	1平方メートルあたり20gから30g	1平方メートルあたり200ミリリットルから300ミリリットル